

Informacje ogólne:

Znieczulenie dożylne polega na podawaniu leków przeciwlękowych, przeciwbólowych i nasennych drogą dożylną. Podczas tego rodzaju znieczulenia pacjent nie odczuwa bólu, a świadomość jest okresowo ograniczona lub całkowicie wyłączona. Znieczulenie ma na celu wyłączenie bólu i lęku oraz zmniejszenie dyskomfortu związanego z zabiegiem. Podczas znieczulenia pacjent jest pod stałym nadzorem lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej, a jego funkcje życiowe, czyli praca serca, oddech, ciśnienie tętnicze i natlenienie krwi są stale monitorowane. Wszystkim pacjentom podawany jest tlen. Po zabiegu pacjent jest przewożony do Sali obserwacyjnej, w której pozostaje do momentu, gdy jego stan ogólny umożliwi opuszczenie placówki w towarzystwie drugiej osoby, dorosłej i godnej zaufania.

Aby zabieg endoskopowy mógł odbyć się w znieczuleniu należy spełnić poniższe warunki:

- Pacjent za zabieg zgłasza się na czczo, dopuszczalne jest picie wody niegazowanej maksymalnie 4 godziny przed znieczuleniem
- W przypadku osób palących nie zaleca się palenia papierosów przed zabiegiem
- Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np.: nadciśnienie tętnicze, choroby serca, tarczycy, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody
- W przypadku cukrzycy nie należy przyjmować leków doustnych przeciwcukrzycowych oraz insuliny (po konsultacji z lekarzem prowadzącym)
- W dniu badania należy zgłosić się bez makijażu i pomalowanych paznokci u rąk (utrudnia to prawidłowe monitorowanie pacjenta), a biżuterię i inne cenne przedmioty prosimy pozostawić w domu.

Możliwe powikłania:

Znieczulenie, jak każde działanie medyczne, obarczone jest pewnym ryzykiem powikłań. Prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań groźnych dla życia jest znikome, zależy przede wszystkim od stanu ogólnego pacjenta i rodzaju wykonywanego zabiegu endoskopowego. Do najczęstszych powikłań należą: reakcja alergiczna leki, zaburzenia czynności układu oddechowego i krążenia. Zespół anestezjologiczny jest przygotowany do natychmiastowego podjęcia leczenia tych powikłań.

Po zabiegu w znieczuleniu dożylnym obowiązuje Pana/Panią powrót do domu pod opieką osoby pełnoletniej i odpowiedzialnej.

W ciągu 12 godzin po znieczuleniu niedozwolone jest:

- Prowadzenie samochodu i innych pojazdów
- Obsług skomplikowanych urządzeń i maszyn
- Picie alkoholu
- Podejmowanie ważnych decyzji osobistych i służbowych
- Wykonywanie innych czynności wymagających pełnej sprawności psychicznej

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących znieczulenia, wymienionych powikłań bądź innych nurtujących problemach związanych z proponowanym znieczuleniem prosimy o kontakt z lekarzem.

Zapoznałem/łam się z wyżej wymienionymi informacjami dotyczącymi wykonania znieczulenia.

.....
Data

.....
Czytelny podpis pacjenta/opiekuna prawnego